

**РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СТАЦИОНАР
ОТДЕЛЕНИЯ МИКРОХИРУРГИИ**

**ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ
СДАТЬ АНАЛИЗЫ ЗА 10-14 ДНЕЙ ДО ПЛАНИРУЕМОЙ ОПЕРАЦИИ**

1. общий анализ крови
2. общий анализ мочи
3. анализ крови на сахар
4. анализ крови на свертываемость - коагулограмма
5. биохимический анализ крови (развернутый)
6. группа крови, резус-фактор (отметка в паспорте не учитывается)
7. РВ (реакция Вассермана)
8. анализ крови на Hbs-антигены (гепатит)
9. анализ крови на ВИЧ
10. ЭКГ, осмотр терапевта
11. рентгеноскопия органов грудной клетки (флюорография действительна в течение 1 года)
12. осмотр гинеколога (для женщин) – действителен 6 месяцев.
13. ПЦР-ковид-19. Годен в течение 3 суток, включая день сдачи анализа.

Анализy необходимо предоставлять на отдельных бланках. Выписка с результатами анализов не принимается. При отсутствии перечисленных анализов операция будет отменена.

В день планируемой операции прибыть приемное отделение больницы к 08.00 утра, натощак (прием таблеток не прерывать). При себе иметь паспорт, сменную одежду, обувь, чашку, столовые приборы.

За 2 недели до даты планируемой операции – подтвердить госпитализацию по телефону.

В случае, если госпитализация не подтверждена – операция будет отменена.

Телефон ординаторской (8-017)-**265-21-96**

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

- За 2-3 недели перед операцией рекомендуется избегать воздействия на кожу оперируемой области прямых солнечных и ультрафиолетовых лучей;
- в течение 2-х недель перед операцией необходимо исключить прием пациентом гормональных противозачаточных средств, аспирина и аспирина-содержащих препаратов, а также максимально ограничить курение;
- накануне операции крайне нежелательно принимать алкогольные напитки;
- вечером накануне операции не следует переедать; ужин должен быть легким;
- психоэмоциональное волнение перед операцией считается обычным явлением: для его уменьшения пациенту можно перед сном принять 2 таблетки любого успокаивающего препарата (седуксен, реланиум, элениум, тазепам, феназепам и т.п.);
- операция проводится строго натощак, последний прием пищи и жидкости должен быть не позднее, чем за 6 часов до операции;
- **операция не проводится в период обострения хронических заболеваний, острых респираторных инфекций. Не рекомендуется проведение операции во время менструации, за 3 дня до и после менструации.**
- на операцию необходимо приходиться без косметики и лака на пальцах рук, ног; хорошо вымытым телом и головой;
- одежда должна быть удобной, легко одеваемой и снимаемой - спортивные штаны, кофта или блузка спереди на застежке, не на каблуках.